DESCRIPTIONS DE BUPRESTIDES NOUVEAUX DE MADAGASCAR

par **André Théry**

Depuis la publication de ma « Révision des Buprestides de Madagascar » en 1905, j'ai augmenté ma collection par l'achat des collections Aubert et Van de Poel ; j'ai eu de plus en communication les chasses du Dr Sicard à Madagascar. Enfin MM. Staudinger et Bang-Haas m'ont adressé en détermination une partie de la collection Meyer-Darcis actuellement en vente chez eux, ce qui, ajouté aux insectes que j'ai pu acquérir de côté et d'autre ou recevoir de mes correspondants, forme un ensemble assez important pour motiver le présent travail.

Polybothris Coquereli var. **purpurea** nov. var. — *Le dessus est entièrement d'un pourpré violet foncé sans aucune tache.*

Polybothris Auberti nov. sp. — Long. 22 mill. ; larg. 7 mill. — *Allongé très atténué en arrière, bronzé cuivreux très légèrement teinté de vert sur les bords, sans taches en dessus, cuivreux verdâtre en dessous ; antennes noires, sauf les trois premiers articles qui sont d'un vert cuivreux; tarses verts.*

Tête avec une profonde impression rectangulaire pubescente sur le front qui est séparé de l'épistome par une carène, vertex avec deux reliefs irréguliers parallèles, yeux fortement saillants.

Prothorax en trapèze, fortement rétréci en avant, avec la marge antérieure assez fortement saillante au milieu, les côtés presque droits, les angles postérieurs aigus, la base bisinuée avec le lobe médian arrondi, la carène latérale n'atteignant pas le milieu, le disque grossièrement ponctué avec une carène médiane lisse, bien marquée, dilatée vers le tiers antérieur et rétrécie après et deux carènes latérales de chaque côté, bien moins marquées, les bords très rugueux.

Ecusson transversal, très petit, impressionné au milieu.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à l'épaule qui est peu marquée, ayant sa plus grande largeur à cet endroit, peu atténués jusqu'au tiers postérieur, largement et peu profondément sinués avant l'extrémité qui est assez prolongée, obliquement tronquée et munie d'une petite dent externe, le disque est couvert de stries régulières profondément ponctuées, plus rugueusement sur les bords, avec les intervalles régulièrement arrondis, les inter-

valles pairs atténués à l'extrémité, on remarque de plus vers le tiers postérieur quelques petites taches peu distinctes, plus claires, verdâtres et finement ponctuées.

Dessous grossièrement ponctué sur le prosternum dont la saillie est entourée d'un sillon entier avec un sillon fortement ponctué au milieu, le métasternum plan, très finement pointillé au milieu, très grossièrement sur les côtés; l'abdomen assez grossièrement et irrégulièrement ponctué, le premier segment avec deux fines carènes assez rapprochées, très aiguës, presque parallèles postérieurement et se continuant sur le deuxième et le troisième segments, les segments ayant de chaque côté une petite plaque lisse irrégulière bleuâtre, le dernier segment subtronqué au sommet.

Patrie : Madagascar sans localité précise (Aubert). 1 exemplaire de ma collection.

Les espèces de ce groupe ayant assez souvent, outre la forme normale, une variété cuivreuse, il est possible que l'on trouve des exemplaires de cette espèce avec les élytres marqués de taches.

En dessus cette espèce est exactement semblable à *P. exophthalma* Guér. avec laquelle on pourrait la confondre facilement, mais en dessous elle en diffère nettement par la saillie prosternale sillonnée et ponctuée et par les carènes abdominales parallèles et prolongées sur le 2^{me} et le 3^{me} segments, tandis qu'elles atteignent à peine le sommet du 1er segment dans *P. exophthalma* Guér. et sont divergentes en arrière.

Polybothris Surcoufi nov. sp. — Long. 21 mill.; larg. 7 mill. — *Allongé atténué en arrière, bronzé sauf les antennes et les tarses qui sont verts, élytres d'un bronzé violacé sur le disque avec des taches plus claires, bordées de deux séries de fossettes pubescentes, une fossette sur le repli épipleural, une série de 7 à 8 très petites fossettes le long de la marge, au dessus de celle-ci une autre rangée peu éloignée du bord et comprenant trois autres fossettes un peu plus grandes.*

Tête avec une profonde impression rectangulaire pubescente sur le front qui est séparé de l'épistome par une carène, vertex avec deux reliefs brillants irréguliers et parallèles; yeux médiocrement saillants.

Prothorax assez court, avec la marge antérieure un peu saillante au milieu, les côtés arqués, les angles antérieurs presque droits, un peu saillants, la base faiblement bisinuée, la carène latérale atteignant le milieu, un empâtement irrégulier, très lisse et très brillant dans l'angle antérieur et situé un peu en dessous, le disque

grossièrement ponctué avec une carène médiane irrégulière lisse entière et des empâtements irréguliers longitudinaux et peu sensibles de chaque côté, les bords très rugueux.

Ecusson transversal très petit.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, arrondis à l'épaule, un peu sinués après le repli épipleural, subparallèles jusqu'à hauteur des hanches postérieures. régulièrement atténués jusqu'au sommet qui est tronqué avec une petite dent externe, le disque est couvert de stries très grossièrement et très profondément ponctuées, avec les intervalles relevés en carènes, les intervalles et les points forment une grosse réticulation sur les bords.

Dessous très grossièrement ponctué, la saillie prosternale bordée d'une strie entière, grossièrement ponctuée au milieu, le premier segment abdominal portant deux carènes subparallèles, obsolètes avant d'arriver au sommet du segment, les segments ornés de chaque côté d'une tache triangulaire pubescente, dernier segment tronqué à l'extrémité.

Patrie : Diego-Suarez (Lt Tremolet). 1 exemplaire de ma collection.

Cette espèce qui m'a gracieusement été donnée par M. Surcouf n'a pas les yeux aussi saillants que *P. exophthalma* Guér., elle me semble avoir sa place naturelle à la suite de *P. Bremei* Fairm., dont elle se distingue par sa forme plus acuminée en arrière, l'empâtement des angles antérieurs du pronotum et le nombre de taches qui bordent les élytres et qui sont réduites à une seule chez le *P. Bremei* Fairm.

Polybothris zivetta var., **imbella** nov. var. — *Dessus entièrement bronzé avec quelques petites cicatrices sur les bords.*

Polybothris madoni nov. sp. — Long. 25 mill.; larg. 10 mill. — *Naviculaire, aussi atténué en avant qu'en arrière, les côtés parallèles sur un peu plus de la moitié de la longueur des élytres; d'un bleu foncé avec des mouchetures sur les élytres, la ponctuation du prothorax d'un vert doré, les élytres bordés de petites fossettes pubescentes au nombre de six de chaque côté, le dessous bleu, à l'exception des côtés du prosternum, du métasternum et du 1er segment abdominal qui sont d'un bronzé doré ainsi que les pattes ; tarses et antennes d'un vert brillant.*

Tête d'un vert cuivreux, front avec des gros reliefs, séparé de l'épistome par une carène, vertex avec deux carènes parallèles rapprochées au milieu et une de chaque côté contre les yeux.

Prothorax en trapèze, avec les côtés presque droits, à peine

arqués vers la base, grossièrement ponctué, surtout sur les bords, disque avec une fine carène entière, lisse, au milieu ; de chaque côté de celle-ci, une autre carène également lisse, sauf quelques gros points, beaucoup plus large, mais plus irrégulière que la médiane, enfin entre celle-ci et le bord se trouve un empâtement longitudinal assez irrégulier, n'atteignant ni la base ni le sommet du prothorax.

Écusson ponctiforme impressionné.

Elytres sensiblement plus larges que le prothorax à la base, non sinués avant l'extrémité, celle-ci tronquée et garnie d'une petite dent externe avec l'angle sutural presqu'arrondi ; le disque est couvert de stries ponctuées dont les points sont à peine perceptibles dans les stries internes, bien que les intervalles soient assez normalement élevés comme dans les espèces voisines, sauf vers la base où ils sont suffisamment atténués pour qu'elle paraisse lisse au milieu. La marge du prosternum est assez nettement anguleuse de chaque côté, avec la saillie lisse, plane, avec quelques rares points; la saillie intercoxale du premier segment abdominal est bordée d'une fine carène, les segments abdominaux sont lisses, avec quelques rares points, munis de chaque côté d'une fossette assez profonde pubescente, le dernier segment abdominal finement rebordé de doré et tronqué au sommet.

Cette espèce est très voisine de *P. zivetta* Klug, elle en diffère par sa forme plus parallèle, les cicatrices qui bordent les élytres plus nombreuses et plus régulières.

Ma collection renferme un exemplaire de cette espèce, provenant de l'ancienne collection Aubert.

Polybothris Staudingeri nov. sp. — Long. 29 mill.; larg. 11.5 mill. — *Naviculaire, de la même forme que* P. zivetta Klug, *d'un cuivreux verdâtre avec des taches bleues formant de vagues fascies transverses sur les élytres, le rebord de l'épaule aplati et lisse et d'un rouge rubis éclatant, l'apex des élytres de la même couleur. Le dessous bleu, sauf les côtés du prosternum, du métasternum et des segments abdominaux qui sont d'un cuivreux doré.*

Tête d'un vert cuivreux avec l'épistome vert clair ainsi que les antennes, le front avec de gros reliefs irréguliers et le vertex avec deux gros reliefs longitudinaux colorés en bleu.

Pronotum en trapèze, fortement rétréci en avant, avec les côtés droits et même quelquefois légèrement incurvés, grossièrement ponctué, surtout sur les bords latéraux; disque avec une carène médiane bien marquée et deux autres carènes irrégulières et mal définies, les carènes, d'une couleur tirant sur le bleu et plus foncée que celle du fond.

Écusson ponctiforme et impressionné.

Elytres acuminés en arrière, légèrement sinués sur les bords avant l'extrémité qui est tronquée obliquement avec une dent externe aiguë; ils sont couverts de stries ponctuées très régulières dont les intervalles sont relevés, notamment à l'arrière; ils présentent sur le disque des bandes bleues transversales, peu nettes, sauf sur les bords qu'elles touchent et où elles sont d'une coloration plus intense, le long de la marge et entre les taches bleues, il y a quatre fossettes pubescentes qui disparaissent complètement chez certains individus; la couleur des bords, exception faite des taches bleues, est, à peu de chose près, la même que celle du disque. Prosternum assez sensiblement bombé en avant, la saillie lisse, plane, bordée d'une strie entière au sommet, les segments abdominaux lisses avec quelques points très rares.

Cette espèce est extrêmement voisine de *P. zivetta* Klug, elle en diffère nettement par les caractères suivants :

Rebord de l'élytre brusquement épaissi à l'épaule, aplati et coloré en rouge rubis, tandis que chez *P. zivetta* Klug il est partout de la même épaisseur ou insensiblement épaissi en avant, apex coloré en rouge rubis et concolore chez *P. zivetta* Klug.

De plus, cette espèce est plus élancée et les côtés du prothorax sont moins arrondis; la coloration de l'apex est faible chez certains individus et très intense chez d'autres.

Ma collection renferme cinq individus de cette espèce, de diverses provenances. MM. Staudinger et Bang-Haas m'en ont également communiqué un bel exemplaire.

Polybothris Renardi nov. sp. — Long. 33 mill.; larg. 12 mill. — *Bronzé violacé en dessus avec une tache noire à l'apex, celle-ci portant une tache pubescente arrondie, dessous d'un brun bronzé violacé, avec les trois derniers segments noirs et absolument lisses, l'apical portant deux taches blanches.*

Le pronotum dilaté en avant, en forme d'oreilles comme chez *P. Goryi* Guer., élytres avec des taches blanches pubescentes sur le disque, fortement acuminées et comprimées latéralement à l'extrémité.

Cette espèce ressemble suffisamment à *P. Goryi* Guer. pour qu'il soit inutile d'en donner une description plus détaillée, elle en diffère par les taches blanches pulvérulentes des élytres, qui sont disposées de la façon suivante et correspondent à des fossettes assez profondes qui n'existent pas chez le *P. Goryi* Guer. : une tache derrière l'épaule, contre la base, une autre arrondie, assez grande sur le lobe épipleural, une autre, analogue, vers le tiers postérieur, de cette tache part une série de plus petites taches

allant rejoindre la tache de l'autre bord en formant un arc de cercle ouvert en avant et assez régulier.

Patrie : Ambositra. — Un exemplaire de ma collection.

Polybothris regalis nov. sp. — Long. 46 mill. ; larg. 21 mill. — *De la même forme que* P. æqualis Wat., aureopilosa Guér. *etc., d'un brun bronzé en dessus avec des taches plus claires, le dessous d'un cuivreux doré, vert au milieu, pattes et antennes violettes.*

Tête obscure, lisse avec un petit nombre de gros points ; front portant une profonde impression en forme de V renversé peu ouvert, bord des yeux avec un sillon densément pubescent. Prothorax court, échancré au bord antérieur, avec les bords aplanis, dilatés en lame mince, les côtés fortement et régulièrement arqués, la base largement bisinuée, les angles antérieurs obtus, arrondis au sommet, les postérieurs légèrement obtus, le disque avec un sillon médian à fond doré, bien net et entier, un assez vague sillon dans les angles antérieurs, les côtés impressionnés, la ponctuation très fine et serrée dans le fond du sillon, rare et irrégulière sur le milieu et très régulière sur les bords où elle est entremêlée de reliefs irréguliers, les bords sont légèrement pubescents et la pubescence est dirigée en avant.

Ecusson petit, subarrondi, impressionné.

Elytres bien plus larges que le pronotum à la base, largement arrondis à l'épaule, atténués en courbe très régulière de l'épaule au sommet où ils sont conjointement arrondis avec une échancrure imperceptible, les bords sont aplanis et tranchants, médiocrement dilatés et légèrement relevés en gouttière, le disque est uni sans être lisse, les stries sont à peine marquées, les bords portent des taches dorées confluentes et débordant sur le disque, à fond finement granuleux, quelques taches analogues se retrouvent sur le disque, principalement dans la moitié postérieure, toute la surface de ces taches est légèrement pubescente.

Dessous très brillant sauf les bords refléchis du thorax qui sont d'un bronzé clair mat, prosternum grossièrement ponctué, pubescent, la saillie bordée d'un strie interrompue en arrière; métasternum ponctué au milieu et rugueux sur les côtés, saillie intercoxale du premier segment abdominal plane et non carénée, segments abdominaux presque lisses au milieu avec des impressions irrégulières largement pubescentes sur les côtés, ciliés sur les bords, le dernier segment concave avec une petite ligne oblique pubescente de chaque côté à la base. Pattes lisses, très peu ponctuées, tarses de la même couleur que les pattes.

Patrie : Ambositra. — Un exemplaire de ma collection.

Polybothris Darwini nov. sp. — Long. 36 mill.; larg. 18 mill. — *Ovalaire, atténué en avant, bronzé avec les reliefs d'un noir foncé, le dessous irisé, la marge inférieure des élytres bleue, les tibias et les tarses cuivreux.*

Tête imponctuée avec de gros reliefs lisses irréguliers sur le front entre lesquels se trouvent des touffes de poils roux, épistome anguleusement échancré, carènes des cavités antennaires prolongées en haut sur le front, très saillantes; antennes bronzées.

Prothorax court, élargi à la base, avec les côtés arqués et paraissant déchiquetés, le bord antérieur un peu saillant au milieu, la base faiblement bisinuée, la carène latérale tout à fait courte, les angles postérieurs aigus, tout à fait arrondis au sommet et un peu prolongés en arrière, le disque avec un sillon très net et assez profond, plus large en arrière et avec un trait dans le fond, impressionné sur les côtés avec de gros reliefs irréguliers plus nombreux en avant et dans les angles antérieurs, les dépressions pubescentes.

Ecusson subcordiforme, impressionné.

Elytres beaucoup plus larges que le pronotum à la base, presque subcordiformes, arrondis à l'épaule, ayant leur plus grande largeur un peu avant le milieu, régulièrement arqués, tronqués au sommet avec une petite dent externe, avec le bord aplani et dilaté, légèrement relevé en gouttière, le disque avec une ponctuation réticulée et quelques lignes élevées dans le voisinage de la suture, ces lignes obsolètes au sommet sont interrompues par des fossettes ponctuées à fond doré, un peu au dessous du milieu et plus près des bords que de la suture on remarque de chaque côté une grande fossette arrondie et pubescente et un peu avant le sommet une tache triangulaire touchant les bords et garni d'une longue pubescence, l'apex est également pubescent, la pubescence qui remplit toutes les fossettes est d'un roux doré.

Prosternum très rugueux en dessous, avec la saillie bordée d'une strie entière en arrière, bombée et fortement ponctuée, métasternum ponctué, segments abdominaux avec une ponctuation formée d'un point en avant se continuant en arrière par un fin sillon, les côtés légèrement pubescents à la base, le dernier segment bordé d'un sillon finement ponctué, et divisé longitudinalement en deux par un sillon finement pubescent.

Cette espèce ressemble à *P. Wautersi* Thény, et surtout à *P. cribraria* Wat., elle diffère de la première par son pronotum moins dilaté, dépourvu de tubercule dans les angles antérieurs, de la seconde par sa taille plus avantageuse, son épistome anguleusement échancré, la grande fossette du milieu de l'élytre et l'apex nettement tronqué.

Patrie : Madagascar. — Un exemplaire de ma collection sans localité précise.

Polybothris Faucherei nov. sp. — Cette espèce est très voisine de *P. auriventris* C. et G. et une description comparative sera tout à fait suffisante pour la faire reconnaître. Le dessus est noir à reflets verts et la coloration du dessous est identique à celle de *P. auriventris* C. et G., la forme est beaucoup plus arrondie sans trace de tronquature à l'apex, tronquature qui est toujours visible dans l'espèce précitée. Le disque, au lieu d'être marqué de trois taches blanches de chaque côté (quelquefois un rudiment de quatrième), porte quatre petites bandes roussâtres obliques, bien marquées, le dernier segment abdominal ponctué comme les autres.

Patrie : Madagascar, Betsimisaraka (Fauchère). — Un exemplaire de ma collection.

Polybothris inedita nov. sp. — Long. 21.5 mill.; larg. 15.5 mill. — *Noir, légèrement bronzé en dessus. Subovalaire, très convexe en dessus, avec trois dépressions pubescentes sur chaque élytre, disposées en lignes plus rapprochées des bords que de la suture; apex concolore ; dessous d'un cuivreux verdâtre avec le bord inférieur des élytres violacé, tournant au pourpré à l'extrémité; le dernier segment abdominal pourpré, lisse, avec un point dans chacun des angles et une petite ligne médiane interrompue au milieu et continuée par quelques points, finement sillonné sur les bords.*

Tête couverte de gros reliefs mats, bords des yeux avec un sillon pubescent, antennes d'un vert bronzé.

Prothorax court, rétréci en avant, avec les côtés régulièrement arqués, la marge antérieure légèrement saillante au milieu, la postérieure anguleuse, avec un petit lobe saillant étroit contre l'écusson, la carène latérale tranchante, entière, les angles antérieurs obtus ; les postérieurs un peu aigus ; le disque avec un sillon médian étroit; assez net mais très superficiel, la ponctuation assez rare, irrégulière et dorée.

Ecusson petit, bronzé.

Elytres beaucoup plus larges que le prothorax à la base, dilatés à partir de l'épaule, aplanis et tranchants sur les bords qui ne sont pas relevés en gouttière, ayant leur plus grande largeur un peu avant le milieu, régulièrement arqués jusqu'au sommet où ils sont conjointement arrondis, avec quelques cils, le disque est couvert de stries assez bien marquées et régulières, mais sans trace de ponctuation, le bord dilaté seul porte quelques points.

Prosternum très grossièrement ponctué, la saillie bordée d'un large sillon en arrière et très ponctuée, le métasternum presque lisse au milieu, la saillie intercoxale large, sans carènes, ponctuée ainsi que les segments abdominaux à l'exception du dernier; pattes et tarses d'un vert cuivreux.

Patrie : Madagascar. — Un exemplaire de ma collection.

Cette espèce ressemble un peu à *P. auriventris* C. et G. mais elle est plus petite, beaucoup plus bombée en dessus, l'apex est concolore, la coloration du dessous et la structure du dernier segment abdominal sont différentes.

Polybothris subpropinqua nov. sp. — Long. 25 mill.; larg. 16 mill. — Cette espèce est voisine de *P. propinqua* Wat., elle en diffère par les caractères suivants :

Couleur noire en dessus, bronzée en dessous, avec quelques reflets violacés sur les pattes et l'abdomen, le bord réfléchi des élytres de la même couleur.

Prothorax beaucoup plus uni avec les angles postérieurs obtus. Disque des élytres avec six fossettes pulvérulentes de blanc, bien marquées, disposées en lignes et plus rapprochées du bord que de la suture, apex subarrondi et non subéchancré, bords réfléchis du prothorax mats imponctués à l'exception de trois ou quatre points isolés, dernier segment abdominal lisse avec quelques points le long de la base et de la ligne médiane.

Patrie : Madagascar. — Un exemplaire de ma collection provenant de la collection Aubert.

Polybthris incerticolor Kerr. — La description de cette espèce a été faite d'après un exemplaire unique de ma collection passablement défraîchi; ayant reçu de M. Surcouf un autre exemplaire de cette espèce, je crois nécessaire de rectifier la description de l'auteur. Le sommet des élytres n'est glabre que parce qu'il est frotté dans le type, l'apex des élytres est brun et couvert d'une forte pubescence, les élytres sont marqués de trois points blancs disposés en lignes et plus près du bord que de la suture et de quelques points secondaires irrégulièrement dispersés. Le premier exemplaire de ma collection ne portait aucune indication de patrie, le deuxième provient de Betsimisaraka du centre.

Polybothris cribripennis nov. sp. — Long. 17 mill.; larg. 8.5 mill. — *Court élargi au tiers postérieur, d'un cuivreux verdâtre en dessus, les reliefs de la tête et du pronotum d'un bleu d'acier, les bords des élytres avec deux impressions pulvérulentes fauves situées, la*

première sur le lobe épipleural, la deuxième un peu avant l'extrémité; dessous d'un bleu azuré verdâtre avec le rebord des élytres d'un vert cuivreux, le pourtour du dernier segment abdominal violacé, l'avant-dernier segment lisse au milieu, la plaque lisse du dernier segment circulaire et entourée d'un profond sillon pubescent, le bord du segment en bourrelet et à ponctuation dorée.

Tête avec des reliefs irréguliers sur le front, antennes verdâtres.

Pronotum rétréci en avant avec la marge antérieure échancrée, les côtés en courbe avec deux sinuosités bien marquées dans la moitié antérieure, la carène latérale sinueuse et dépassant le milieu, les angles postérieurs aigus, la marge postérieure à peine bisinuée, le disque avec quelques impressions sur les côtés et dans les angles postérieurs, sans sillon médian, à surface fortement ponctuée et à aspect corrodé.

Ecusson ponctiforme, arrondi, très brillant.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, un peu sinués au dessous de l'épaule, ayant leur plus grande largeur au tiers postérieur, puis brusquement atténués; un peu sinués avant l'extrémité où ils sont conjointement arrondis. Disque couvert de stries régulières formées de très gros points enfoncés donnant à la surface un aspect rugueux et corrodé, les stries aussi bien marquées sur les bords qu'au milieu.

Dessous très ponctué, ayant le même aspect corrodé que le dessus, saillie du prosternum avec une strie entière en arrière; côtés des segments abdominaux avec quelques reliefs lisses d'un bleu d'acier.

Cette espèce est voisine de *P. crassa* Wat., elle en diffère par sa forme encore plus large, sa taille plus avantageuse, la couleur du dessus et du dessous, la ponctuation du métasternum beaucoup plus forte, la plaque anale plus arrondie.

Patrie : Madagascar. — Un exemplaire de ma collection.

Actenodes Le Moulti nov. sp — Long. 11 à 16 mill.; larg. 4.5 à 6 mill. — *Déprimé fortement et triangulairement atténué en arrière, la tête ainsi que la base des élytres bleues ou d'un vert bleuâtre passant insensiblement au jaune vers le milieu des élytres puis au rouge cerise qui repasse au bleu d'acier à l'apex, dessous d'un vert cuivreux sauf les pattes et l'abdomen qui sont bleuâtres.*

Tête unie finement sillonnée sur le vertex, fortement et très régulièrement ponctuée avec de fines rides sous les yeux, ceux-ci grands et se touchant presqu'en arrière, cavités antennaires grandes, placées en contre-bas du front, sans carènes saillantes,

épistome court, très large, faiblement échancré, bordé antérieurement par une petite carène aplatie, noire, lisse et brillante; antennes d'un bleu foncé.

Pronotum faiblement ponctué au milieu, la ponctuation beaucoup plus forte sur les bords, très régulièrement espacée sur toute la surface, la marge antérieure fortement échancrée, les côtés arrondis en avant en courbe régulière et presque droits postérieurement, presqu'entièrement rebordés sur les côtés par une carène très nette atteignent les angles antérieurs qui sont très abaissés; les angles postérieurs très aigus ; la base fortement bisinuée avec le lobe médian large et arrondi; le disque impressionné le long de la marge antérieure, l'impression ayant sa plus grande largeur au milieu, une impression semi-circulaire près des angles et une autre plus arrondie de chaque côté, un peu plus haut que la base et touchant presque la précédente.

Ecusson ponctué, en triangle isocèle, aigu.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, arrondis à l'épaule où ils ont leur plus grande largeur, presque droits jusqu'au tiers postérieur puis atténués jusqu'à l'extrémité qui est terminée par un angle très aigu et prolongé en pointe; la suture relevée en carène sur la plus grande partie de sa longueur; le disque très régulièrement ponctué sur toute la surface, sans traces de stries, impressionné vers la base avec des traces de sillons longitudinaux superficiels. Côtés du prosternum lisses sur les bords, fortement et peu densément ponctués au milieu, les points portant des poils; saillie prosternale très déprimée, peu ponctuée, bordée d'une très fine strie contre les hanches antérieures, retrécie au milieu, élargie en arrière et terminée en pointe; saillie intercoxale du premier segment abdominal arrondie au sommet, lisse à l'extrémité; suture des premier et deuxième segments bien visible, base des segments 3, 4 et 5 bordée par une bande noire lisse séparée par une fine strie: extrémité du dernier segment tronquée et légèrement sinuée, cuisses fortement pubescentes au bord postérieur.

Patrie : Madagascar.

Description faite d'après trois exemplaires de ma collection acquis à Le Moult.

Cette espèce ressemble beaucoup en dessus à *A. Alluaudi* Kerr., mais elle est beaucoup plus petite, différemment colorée en dessous, avec les yeux plus rapprochés en arrière, l'écusson plus court, elle est moins acuminée postérieurement, etc.

Paradora Sicardi nov. sp. — Long. 4.5 mill.; larg. 2.5 mill. — *Court, large, très convexe en dessus, noir, brillant, couvert*

de gibbosités lui enlevant toute forme définissable, le front légèrement pubescent.

Tête profondément sillonnée, le sillon divisant la tête en deux lobes réguliers, front légèrement tuberculé en avant, séparé des cavités antennaires par un sillon horizontal, épistome réduit à une lame avec deux branches linéaires et resserré entre les cavités antennaires qui sont contiguës, antennes courtes avec les deux premiers articles épais.

Pronotum en trapèze, presque rectangulaire, court, saillant au milieu du bord antérieur, rebordé d'une fine strie, avec les angles antérieurs aigus, très abaissés, les postérieurs subdroits, arrondis au sommet, la marge latérale finement rebordée et sinueuse, la base sinueuse avec un lobe médian tronqué, droit au devant de l'écusson. Le disque est couvert de gros tubercules, dont un énorme au milieu entouré de quatre plus petits disposés en trapèze, le reste de la surface irrégulier. Il est couvert de fines stries parallèles et plus ou moins concentriques.

Ecusson grand en triangle isocèle, lisse, brillant, un peu concave.

Elytres à peu près de la largeur du prothorax à la base, sinués après l'épaule, ayant au tiers postérieur à peu près la même largeur qu'à l'épaule, atténués ensuite jusqu'à l'extrémité où ils sont isolément arrondis, bordés d'une fine strie et sans denticulation distincte, le calus huméral est relevé en forme d'oreilles, au dessous de celui-ci se trouve un tubercule un peu allongé et aplati, situé à égale distance de la suture et du bord, en arrière de l'élytre deux autres petits tubercules et une petite élévation allongée sur les bords, la ponctuation est remplacée par des stries obliques assez écartées, concentriques sur les tubercules. De chaque côté des élytres l'abdomen déborde fortement, le dessous est très densément ponctué, la ponctuation en forme de petites écailles, l'abdomen est renflé et dans l'angle antérieur du troisième segment se trouve un petit triangle de pubescence argentée peu visible.

Cette espèce ressemble beaucoup à *Paradora deformis* Fairm. et je l'ai autrefois déterminée sous ce nom, elle s'en distingue principalement par la présence du gros tubercule au milieu du pronotum.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection et collection du Dr Sicard.

Suarezia nov. gen. — Tête convexe, sillonnée longitudinalement sur le front, paraissant plane sur le vertex autant que le laisse voir une abondante pubescence laineuse, légèrement bituberculée en avant, carènes surmontant les cavités antennaires horizontales,

cavités antennaires grandes, épistome étroit, resserré entre les cavités qui sont rapprochées en avant sans être contiguës, extrémité de l'épistome échancrée. Antennes courtes, dentées à partir du sixième article, le 1er et le 2e subégaux, épais, renflés au sommet et allongés, les suivants très courts et subégaux. Yeux assez grands, elliptiques un peu obliques, écartés en arrière sur le vertex. Pronotum couvert d'une épaisse tomentosité laineuse qui empêche d'en percevoir les détails, néanmoins on peut se rendre compte qu'il existe des tubercules derrière les bords et un tubercule central, ils sont impressionnés sur les côtés et en arrière, la marge antérieure est peu saillante en avant, les côtés sont dilatés, aplanis, très anguleux avec l'angle postérieur très obtus et presqu'arrondi ; une carène latérale entière, la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Ecusson grand, en triangle isocèle. Elytres très peu convexes, médiocrement allongés, relevés en crête à l'épaule, arrondis au sommet. La marge antérieure du prosternum me paraît munie d'une mentonnière mais je n'ai pu décoller cet insecte pour en examiner le dessous, les hanches antérieures me paraissent semblables à celles du genre *Paradora*. Pattes peu robustes, les fémurs subfusiformes, les postérieurs un peu arqués, tibias grêles, tarses courts avec les articles subégaux, les crochets bifides ; abdomen dépassant les élytres. Pygidium armé d'une petite pointe horizontale en dessus. Corps couvert de pubescence.

J'ai fondé ce genre pour une espèce de Madagascar voisine du genre *Paradora* dans lequel il est impossible de la faire entrer. Au premier abord elle ressemble beaucoup à *Cissicorœbus cornutus* Fairm. et on serait tenté de la placer dans le même genre.

Suarezia albicollis nov. sp. — Long. 8 mill. ; larg. 3.5 mill. — *Court dilaté à hauteur du tiers postérieur, pronotum recouvert d'une pubescence laineuse d'un blanc légèrement jaunâtre, élytres avec une courte pubescence squameuse, dressée, noire ; côtés de l'abdomen avec une large tache de pubescence de même couleur que celle du pronotum.*

Tête couverte d'une longue pubescence laineuse, un peu clairsemée. Pronotum couvert d'une longue et dense pubescence dirigée vers le centre et remontant sur les tubercules pour former des houppes, elle est au sommet de ces tubercules mélangée de quelques poils noirs. Les angles postérieurs sont dénudés ainsi qu'un espace au devant de l'écusson et un petit triangle de chaque côté.

Ecusson triangulairement impressionné, le fond de l'impression à aspect granuleux.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, dilatés à l'épaule, un peu sinués après, élargis au tiers postérieur, finement granuleux

sur toute leur surface et brillants, sans côtes ni impressions, la pubescence noire dressée est plus forte sur les crêtes surmontant les calus huméraux, ils sont finement rebordés presque jusqu'au sommet, le dessous est d'un aspect finement granuleux et la pubescence est en forme de petites écailles cachées en partie par la pubescence blanche qui occupe les côtés des bords réfléchis du prothorax, les côtés des deux premiers segments abdominaux ainsi que les flancs du métasternum où elle est plus rare ; les pattes sont également finement pubescentes de blanc ; le dernier segment abdominal est concave.

Patrie : Diego-Suarez. — Un exemplaire de ma collection.

Diplolophotus Sicardi nov. sp. — Long. 4.5 mill. — *D'un bronzé verdâtre brillant en dessus, le prothorax avec des taches médianes et latérales blanches, les élytres ayant chacun quatres taches de même couleur disposées sur une même ligne et couvertes d'une pubescence très espacée ; dessous cuivreux avec des taches triangulaires pubescentes de chaque côté des segments abdominaux.*

Tête sillonnée sur le vertex, le sillon pubescent est rempli de pulvérulence blanche ; bituberculée au sommet du front, à peine bombée en avant et rugueusement ponctuée ; front séparé de l'épistôme par une carène, épistôme largement échancré avec les branches latérales très développées, cavités antennaires ouvertes en dessus et antennes portées verticalement, celles-ci courtes, cuivreuses, à articles dentés bien développés. Prothorax dilaté en avant, la marge antérieure bisinuée, finement rebordée, les côtés arrondis en avant sinués avant la base où ils sont presque droits, le bord postérieur anguleusement sinué de chaque côté avec un lobe médian légèrement échancré lui-même, les angles antérieurs excessivement aigus, les postérieurs obtus, la carène latérale sinueuse, la carène supérieure partant de l'angle postérieur formant une courbe et rejoignant la carène normale, la carène inférieure sinueuse et ne rejoignant pas la carène normale en avant ; le disque est fortement impressionné sur les côtés avec deux fossettes superposées sur la ligne médiane, les impressions et les fossettes garnies d'une pubescence dense et remplie de pulvérulence blanche, la ponctuation est remplacée par des stries très fines, transversales, très nettes, généralement en courbes ouvertes vers l'avant.

Ecusson très saillant, large, finement pointillé, parcouru dans sa largeur par une carène crénelée, fortement sinué sur les côtés et terminé par une pointe fine.

Elytres à peine plus larges à l'épaule que la base du prothorax, presque droits jusqu'au tiers postérieur où ils ont leur plus grande largeur, régulièrement arrondis ensuite jusqu'au sommet où ils sont

finement denticulés, fortement impressionnés à la base derrière l'épaule, avec la suture relevée en carène sur la moitié postérieure, la surface finement granuleuse et paraissant couverte de très petites écailles, ornés chacun de quatre taches pubescentes d'un blanc pur, la première située dans l'impression de la base, la deuxième au tiers antérieur, linéaire, située à égale distance de la suture et de la marge, la troisième subarrondie, vers le tiers postérieur et plus rapprochée de la suture, la quatrième contre la suture un peu avant l'extrémité. Les quatre premiers segments abdominaux débordant les élytres, visibles par dessus et couverts d'une villosité blanche. Dessous très finement pubescent avec une tache triangulaire de pubescence plus dense sur les côtés des segments abdominaux.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection, et collection du Dr Sicard.

Agrilus Mayeti nov. sp. — Long. 9.5 mill. — *Noir verdâtre en dessus avec une tache de pubescence pulvérulente d'un blanc jaunâtre sur le front et une autre sur les bords du pronotum, dessous abondamment garni de cette même pulvérulence, ne laissant à découvert qu'une partie des bords des quatre premiers segments abdominaux et leur milieu.*

Tête fortement sillonnée sur le vertex et divisée en deux lobes bombés, un peu déprimée sur le front qui est séparé de l'épistôme par une carène fine et brillante, celui-ci placé en arrière-plan, très court, largement échancré en avant; cavités antennaires arrondies ouvertes latéralement, antennes atteignant le milieu du pronotum.

Pronotum transversal, un peu plus large en avant qu'en arrière, à peine saillant au bord antérieur, les angles antérieurs aigus, abaissés, les côtés arrondis en avant et sinués avant la base, avec la carène marginale presque droite, la carène supérieure bien marquée, courte, n'atteignant pas le milieu du pronotum, l'inférieure entière, unie à la normale sur le tiers de sa longueur en arrière; la base est fortement bisinuée, avec le lobe médian sinué lui-même au devant de l'écusson, le disque est fortement impressionné sur les bords; sur la ligne médiane, deux fossettes superposées forment une sorte de sillon, il est couvert de lignes transverses onduleuses, plus rugueuses sur les côtés.

Ecusson transversal, court, subpentagonal, caréné dans sa largeur.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, presque parallèles sur deux tiers de leur longueur ensuite atténués jusqu'à l'extrémité où ils sont terminés par une forte pointe; le disque est couvert d'une large impression régulière partant des épaules et

aboutissant au sommet, les bords de cette impression sont très nets et qui font paraître l'élytre comme parcouru par une côte; la base est impressionnée largement, la ponctuation est en forme de petites écailles et très rapeuse à la base et sur les bords. En dessous les parties non recouvertes par la pubescence sont finement ponctuées.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection qui m'a été autrefois donné par notre regretté collègue VALERY MAYET.

Tableau des Aphanisticus de Madagascar faisant partie de ma collection.

1.	Elytres moins larges au tiers postérieur que le prothorax ou au plus égaux à celui-ci.	2
	Elytres plus larges au tiers postérieur que le prothorax.	*mitratus*
2.	Elytres avec des côtes plus ou moins marquées	3
	Elytres sans côtes bien marquées. . . .	10
3.	Elytres sans fossettes arrondies sur le disque.	6
	Elytres avec une fossette arrondie de chaque côté de la suture.	4
4.	Côtes discales peu nettes et obsolètes avant l'extrémité	5
	Côtes discales nettes et prolongées jusqu'au sommet	*Mayeti*
5.	Tête vue de dessus paraissant armée de deux pointes.	*Rollei* n. sp.
	Tête vue de dessus paraissant armée de deux tubercules	*angustifrons* n. sp.
6.	Côtes des élytres obsolètes, incomplètes ou en nombre inférieur à trois.	7
	Côtes des élytres entières et au nombre de trois	*Goudoti*
7.	Elytres sans impression transversale anormale	8
	Elytres impressionnés transversalement.	*impressipennis*
8.	Taille petite, 2.5 mill.	9
	Taille plus grande, 3.25 mill. couleur noire	*cristatus*
9.	Front armé de deux pointes	*elegans*
	Front en forme de croissant	*Tondui* n. sp.
10.	Pronotum dilaté et aplani sur les bords, noir ou noir bronzé brillant.	11
	Prothorax non dilaté, bronzé soyeux . .	*integricollis*

11.	Une fossette arrondie ou ovale dans les angles postérieurs du pronotum . . .	12
	Fossette remplacée par un sillon. . . .	*Sicardi*
12.	Front fortement échancré.	13
	Front arrondi en avant et simplement sillonné	*rotundicollis* n. sp.
13.	Tête fortement échancrée en avant mais les bords de l'échancrure non ou à peine prolongés en pointes.	14
	Bords de l'échancrure prolongés en avant en pointe aigue.	15
14.	Ponctuation des élytres peu sensible, obsolète, apex élytral épineux	*denticulatus* n. sp.
	Ponctuation nette profonde, apex inerme.	*Bouvieri*
15.	Elytres ridés	16
	Elytres nettement ponctués	*maleficds*
16.	Rides obsolètes au sommet.	*inornatus*
	Rides bien marquées sur toute la surface.	*Grandidieri* n sp.

Je n'ai pu faire rentrer dans ce tableau six espèces d'*Aphanisticus* que je ne connais que par leur description. Parmi celles-ci se trouvent *A. ater* C. et G. et *A. auriculatus* C. et G., dont les descriptions et les figures laissent tellement à désirer qu'il est impossible d'en faire un usage quelconque.

Ma collection renferme un exemplaire d'*A. bilobiceps* Fairm. comparé par Kerremans au type de Fairmaire et provenant de Zanzibar; j'ai constaté que cet exemplaire était absolument identique à mon *A. Mayeti* décrit bien antérieurement.

Mon exemplaire m'a été donné par Valery Mayet qui m'en a certifié l'origine, j'en conclus que l'*A. Mayeti* est une des rares espèces malgaches qui se retrouvent sur le continent africain.

Aphanisticus Rollei nov. sp. — Long. 2 3/4 mill.; larg. 0.75 mill. — *Bronzé, médiocrement convexe, la tête portant deux pointes en avant, les élytres plissés transversalement, avec une côte longitudinale, une fovéole au milieu du disque, l'apex épineux.*

Tête profondément excavée sur le front, les saillies des bords de l'excavation formant en avant, et vu de dessus, deux petites pointes aiguës, à ponctuation extrêmement fine et serrée et à peine visible.

Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus grande largeur au milieu, convexe sur le disque, aplani sur les bords, le bord antérieur fortement échancré, les côtés régulièrement arrondis et un peu redressés à la base, crénelés sur les bords,

les angles antérieurs et postérieurs obtus, la marge postérieure bi-sinuée avec le lobe médian étroit et arrondi au sommet, le disque impressionné sur les bords latéraux, avec une fossette profonde dans les angles postérieurs et une longue impression élargie en son milieu, située un peu en arrière de la marge antérieure, la surface entièrement couverte d'une excessivement fine ponctuation, à aspect un peu granuleux et, en outre de celle-ci, on remarque des points cicatriciels arrondis et espacés, plus grands et plus nombreux sur les bords.

Écusson très petit mais bien visible, arrondi en arrière. Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base, rétrécis et échancrés à hauteur des hanches postérieures, un peu dilatés vers le tiers postérieur et, à cet endroit, à peu près de la même largeur que le prothorax, puis régulièrement atténués jusqu'à l'extrémité avant laquelle ils sont légèrement sinués, subtronqués à l'extrémité, avec une forte dent au milieu de la tronquature, un peu déhiscents au sommet; fortement impressionnés sur les bords en dessous de l'épaule ainsi qu'au sommet; le disque est parcouru par une fine carène qui part du milieu de la base et continue en restant parallèle à la suture jusqu'au sommet, ils sont ridés à la base, avec une grosse fossette arrondie, située à peu près au tiers antérieur de chaque côté de la suture.

Patrie : Madagascar. — Un exemplaire de ma collection (Rolle).

Aphanisticus angustifrons nov. sp. — Long. 3 mill.; larg. 1 mill. — *Noir bronzé, tête portant en avant deux crêtes verticales, les élytres avec les côtes rudimentaires à la base, plissées transversalement au milieu sur le tiers antérieur, anguleux au sommet où ils sont imperceptiblement denticulés.*

Tête subglobuleuse avec deux fortes saillies en crêtes verticales arrondies en avant, extrêmement finement ponctuée et irrégulièrement parsemée de cicatrices ombiliquées superficielles.

Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus grande largeur au milieu, bombé sur le disque, aplani sur les côtés, la marge antérieure échancrée et peu saillante au milieu, les côtés arrondis et brusquement redressés en arrière, rebordé et finement crénelé sur les bords, les angles antérieurs aigus, les postérieurs subdroits, la marge postérieure sinueuse avec un lobe médian arrondi au devant de l'écusson, le disque avec un bourrelet le long du bord antérieur derrière lequel se trouve un sillon transversal, un tubercule aplati un peu avant la base, de chaque côté de la ligne médiane et une profonde fossette arrondie dans les angles postérieurs; la surface est ponctuée de la même façon que la tête.

Ecusson assez grand pour le genre et triangulaire.

Elytres à peine plus larges à l'épaule que le prothorax à la base, sinués à hauteur des hanches postérieures, ayant leur plus grande largeur un peu avant le tiers postérieur ou ils ont sensiblement la même largeur que le prothorax, puis régulièrement atténués jusqu'à l'extrémité ou ils sont un peu anguleux avant celle ci et terminés en angle un peu obtus et extrêmement finement denticulés. Ils sont impressionnés tout à fait à la base derrière l'épaule et à l'apex en sorte que le pourtour de l'élytre à cet endroit est relevé en bourrelet; la ponctuation est formée de gros points irréguliers à la base et de traits excessivement fins disposés en ligne sur le reste de l'élytre.

Dessous peu distinctement ponctué.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection et collection du Dr Sicard.

Aphanisticus Tondui nov. sp. — Long 2,3/4 mill.; larg. 1.2 mill. — *Noir avec la tête et le pronotum bronzés à reflets dorés.*

Tête très large en avant, fortement excavée sur le front et le vertex, munie en avant de deux grosses crêtes saillantes verticales qui vues de dessus offrent la forme d'un croissant; élytres sans côtes lisses bien marquées, sauf une petite carène sur le calus huméral et une autre sur le côté à l'extrémité, celle-ci légèrement dilatée et terminée par deux très fortes épines l'interne étant la plus développée.

Tête avec l'excavation en arête vive sur les bords, vue de dessus cette excavation atteint presque le bord du pronotum, elle est parcourue dans le fond par une strie nette bien marquée, la ponctuation est formée de points excessivement fins et très serrés et de grandes cicatrices ombiliquées superficielles.

Pronotum presqu'aussi large en avant qu'en arrière, avec le bord antérieur échancré et droit au milieu, les angles antérieurs complètement arrondis, les postérieurs très obtus, les côtés arrondis, à denticulation à peine distincte, la base sinueuse avec un lobe médian assez étroit, prolongé en arrière et arrondi au sommet, le disque est impressionné sur les côtés qui sont dilatés et aplanis, parcouru le long du bord antérieur par une large carène derrière laquelle se trouve un sillon un peu anguleux au milieu, un peu avant le milieu, une autre très large carène derrière laquelle se trouve une forte impression transversale, enfin de chaque côté, contre la base une autre petite carène courte arrondie au sommet et dans les angles postérieurs une profonde fossette arrondie.

Ecusson petit, brillant, arrondi en arrière.

Elytres un peu plus étroits que la base du prothorax, subparal-

lèles jusqu'au milieu, puis insensiblement atténués jusqu'au sommet avant lequel ils sont largement sinués, l'extrémité très largement tronquée avec une forte épine légèrement recourbée vers l'extérieur au bord externe, une autre épine beaucoup plus forte au milieu de la tronquature et une dent à l'angle satural. Le disque est impressionné le long de la base et au dessous de l'épaule, également le long de la suture et au sommet, il est couvert de vagues rides transversales et son aspect est soyeux, sans ponctuation distincte.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. Un exemplaire de ma collection.

Aphanisticus rotundicollis nov. sp. — Long. 2.2 mill. ; larg. 0.75 mill. — *Noir, brillant, tête globuleuse et sillonnée en avant, elytres avec la moitié antérieure portant des séries des très gros points enfoncés et la moitié postérieure lisse, isolément acuminés au sommet et finement denticulés.*

Tête absolument globuleuse, vue en dessus et légèrement échancrée en avant par la présence d'un sillon frontal à fond arrondi; yeux presque contigus en avant; ponctuation très fine et entremélée de points cicatriciels superficiels.

Pronotum transversal, ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu, très bombé sur le disque qui est régulièrement uni et continue la courbe de la tête, impressionné seulement le long de la base avec les bords aplanis relativement étroits; la marge antérieure presque droite, les angles antérieurs obtus, les côtés arrondis et un peu redressés à la base, non visiblement denticulés sur les bords, les angles postérieurs à peine obtus avec une fossette très profonde à bords abrupts dans ces angles, la base droite avec un petit lobe saillant subanguleux au milieu, le milieu du disque paraissant lisse, la ponctuation étant visible seulement sur les bords latéraux et analogue à celle de la tête.

Ecusson très petit.

Elytres un peu plus étroits à l'épaule que le prothorax au milieu, ayant un peu avant le tiers postérieur la même largeur qu'à la base, échancrés à hauteur des hanches postérieures, régulièrement atténués du tiers postérieur au sommet avant lequel ils sont sinués, isolément acuminés au sommet en angle obtus et finement denticulés; légèrement impressionnés à la base derrière l'épaule et le long de la suture jusqu'à l'extrémité dont les bords sont de ce fait relevés en bourrelet, le calus huméral lisse, brillant et saillant avec quelques gros points au-dessous du calus sur la marge latérale; la moitié antérieure du disque sauf tout contre la base avec des

séries de gros points enfoncés ne dépassant guère le milieu, la deuxième moitié lisse et sans ponctuation visible.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection.

Aphanisticus denticulatus nov. sp. — Long. 2 mill. ; larg. 0.75 mill. — *Noir avec les côtés du pronotum dorés ; tête globuleuse, subéchancrée en avant, les élytres épineux et denticulés à l'extrémité.*

Tête à ponctuation extrêmement fine et entremêlée de quelques points ombiliqués; yeux assez rapprochés en avant.

Pronotum bombé, très court, arrondi sur les côtés qui sont visiblement denticulés, presqu'aussi large en avant qu'en arrière, ayant sa plus grande largeur au milieu, échancré au bord antérieur, les angles antérieurs aigus, les postérieurs complètement arrondis, la base très fortement sinueuse avec le lobe médian saillant et arrondi au sommet, profondément sillonné le long du bord antérieur, le sillon plus éloigné du bord au milieu, impressionné sur les côtés qui sont aplanis et médiocrement dilatés, sillonné le long du bord postérieur avec une petite carène transversale tout contre la base de chaque côté de l'écusson et une profonde fossette dans les angles postérieurs, la surface à structure granuleuse entremêlée de quelques gros points superficiels moins nettement ombiliqués que chez la plupart des espèces du même genre.

Ecusson petit, subtriangulaire.

Elytres un peu plus étroits à l'épaule que le pronotum au milieu, légèrement échancrés à hauteur des hanches postérieures ayant leur plus grande largeur un peu après le milieu, puis atténués jusqu'à l'extrémité où ils sont finement denticulés avec une dent médiane, impressionnés à la base, sur les bords au-dessous de l'épaule et le long de la suture, cette dernière impression n'atteignant pas l'apex; disque avec quelques stries bien marquées sur la moitié antérieure et à fond soyeux.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection.

Aphanisticus Grandidieri nov. sp. — Long. 3 mill. ; larg. 0.95 mill. — *Allongé, d'un noir bronzé, ayant sa plus grande largeur au milieu du prothorax, tête globuleuse avec deux crêtes étroites qui, vues de dessus, produisent l'effet de deux petites cornes légèrement divergentes, élytres très fortement ridés sur toute leur surfae, terminés par une dent épineuse au sommet.*

Tête sillonnée sur le front et le vertex, à ponctuation foncière

indistincte mais parsemée de petites cicatrices arrondies et très superficielles, yeux assez distants en avant.

Pronotum échancré au bord antérieur qui est fortement saillant au milieu, avec les angles antérieurs aigus, les côtés arrondis et brusquement redressés à la base, les angles postérieurs aigus, la base assez fortement sinueuse avec un lobe médian assez large, en angle légèrement obtus, arrondi au sommet ; le disque avec un large sillon derrière le bord antérieur, fortement élargi au milieu, très fortement impressionné sur les côtés qui sont aplanie et dilatés, transversalement impressionné après le milieu, avec deux tubercules peu saillants en arrière de cette impression et une énorme fossette subtriangulaire dans les angles postérieurs, la ponctuation du disque est très fine, un peu granuleuse et parsemée de cicatrices ombiliquées superficielles, la ponctuation et les cicatrices mieux marquées sur les bords.

Ecusson petit, en triangle allongé, granuleux.

Elytres de la même largeur que la base du prothorax, sinués latéralement à hauteur des hanches postérieures, ayant leur plus grande largeur vers le milieu, atténués ensuite jusqu'à l'extrémité avant laquelle ils sont légèrement sinués, terminés en angle denté au sommet et vaguement denticulé. Le disque est impressionné à la base, sur les côtés au-dessous de l'épaule, le long de la suture, l'impression occupant toute la surface de l'apex et en faisant paraître les bords saillants; ils sont couverts de stries formées de petits traits et fortement ridés transversalement sur toute leur surface. L'abdomen est couvert de petites cicatrices allongées.

Patrie : Montagne d'Ambre (Madagascar). — Un exemplaire de ma collection.

Habroloma velutina nov. sp. — Long. 2.2 mill. ; larg. 1.3 mill. — *Court, atténué en arrière, noir à reflets violacés, recouvert d'une pubescence d'un rouge doré cuivreux, entremêlée par place de pubescence argentée.*

Tête très large, front fortement impressionné à la base et presque caché sous la tête, largement sillonné, le sillon se continuant sur le vertex; yeux surmontés d'une crête étroite, très saillante, presque entièrement cachés derrière l'angle du pronotum ; la ponctuation est invisible et toute la surface est parsemée de poils cuivreux.

Pronotum très large, dilaté sur les bords, qui sont en arc de cercle, avec les angles antérieurs saillants en avant et aigus, les postérieurs un peu obtus, la base fortement quadrisinuée avec le lobe médian tronqué et un peu échancré au-devant de l'écusson, une profonde fossette oblongue, transversale dans les angles posté-

rieurs, impressionnés sur les côtés et le long de la base dont le bord est relevé en carène, sans ponctuation distincte, les bords avec une pubescence assez longue et modérément dense.

Écusson assez grand, lisse, triangulaire

Élytres sensiblement de la même largeur que le pronotum à la base, avec le calus huméral médiocrement saillant, régulièrement atténués en ligne courbe jusqu'à l'extrémité où ils sont conjointement arrondis, avec une très fine carène partant du calus huméral et atteignant le sommet, de lignes de gros points peu visibles sous la pubescence; celle-ci est grise et forme deux fascies transverses vers l'extrémité et une petite tache avant le milieu contre la suture, ces fascies sont peu denses et mal délimitées.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection, et collection du Dr Sicard.

Trachys Auberti nov. sp. — Long. 3 mill.; larg. 1.75 mill. — *Ovalaire, bronzé, assez densément pubescent, la pubescence de couleur jaunâtre avec deux fascies transversales blanchâtres à l'extrémité.*

Tête fortement impressionnée en avant et paraissant échancrée, vue de dessus, sillonnée sur le front, avec le bord antérieur des yeux arrondi, sans ponctuation distincte, celle-ci remplacée par des petits ronds superficiels assez rapprochés les uns des autres; yeux peu saillants.

Prothorax transversal, à bord antérieur faiblement échancré, légèrement bi-sinué, les angles antérieurs aigus, les côtés très obliques et légèrement courbes, paraissant sous un certain jour légèrement striés sur les bords; les angles postérieurs très aigus, la marge postérieure fortement quadri-sinuée avec un lobe médian large et subdroit au sommet; disque régulièrement arrondi et impressionné seulement le long de la base, au milieu, finement pubescent et à ponctuation mal définie au milieu et formée seulement de petits points d'où émergent les poils; sur les bords la ponctuation paraît formée de petits tubercules arrondis, assez serrés, aplatis avec un point central.

Écusson invisible.

Élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, avec le calus huméral médiocrement saillant, ayant leur plus grande largeur à l'épaule, droits jusqu'au tiers postérieur, puis régulièrement atténués en courbe jusqu'au sommet où ils sont conjointement arrondis; ils sont impressionnés à la base, et à ponctuation formée de lignes de petites cicatrices fort embrouillées, la pubescence est relativement dense et forme, outre quelques petites taches assez irrégulières, deux fascies transverses et très onduleuses vers l'extrémité. Dessous finement et très régulièrement pubescent.

Cet insecte que j'ai acquis avec la collection du Dr Maurice Aubert de Toulon porte une étiquette manuscrite de Fairmaire, lui attribuant le nom de *T. obsoleta* Chev. Il n'y a certainement aucun rapport entre ces deux espèces puisque le *T. obsoleta* est indiqué par son auteur comme étant d'un noir brillant, avec le bord antérieur des yeux carénés, caractères qui ne se retrouvent pas dans mon espèce. Je cite cette erreur parce que Fairmaire a mal connu les espèces de *Trachys* de Madagascar, anciennement décrites, et les utilise comme termes de comparaison dans ses descriptions.

Trachys pigra nov. sp. — Long. 2.6 mill.; larg. 1.6 mill. — *D'un bleu noirâtre, parsemé de poils argentés formant deux fascies transverses sur les élytres, court, peu atténué à l'extrémité.*

Tête large, peu saillante en dehors du prothorax, fortement concave entre les yeux, finement sillonnée sur le front et le vertex, sans ponctuation distincte, parsemée de rares poils argentés, avec deux petites fossettes profondes arrondies au dessus des cavités antennaires.

Pronotum très large et très court, échancré en avant, droit au milieu du bord antérieur, avec les angles antérieurs subaigus, ainsi que les angles postérieurs, les côtés régulièrement arrondis, bordés d'une carène latérale sinueuse, quadrisinués à la base, avec un large lobe médian arrondi, régulièrement bombés sur le disque, un peu aplanis sur les côtés et très peu impressionnés sur les bords, le disque sans ponctuation distincte mais avec quelques vagues petites cicatrices superficielles, desquelles émergent des poils recourbés argentés, la marge, comme celle de la base des élytres, relevée en fine carène.

Écusson bien visible, en triangle isocèle, lisse.

Élytres à peine plus larges que le prothorax à la base, avec le calus huméral peu saillant, légèrement sinués après l'épaule, peu rétrécis jusqu'au tiers postérieur et ensuite assez brusquement atténués en ligne courbe jusqu'à l'extrémité, faiblement impressionnés sur le disque derrière le calus huméral, sans ponctuation bien distincte mais avec de vagues traces de lignes ponctuées sur le disque, ornés de poils argentés épars et de deux bandes pubescentes de même couleur, la première onduleuse vers le tiers postérieur et la deuxième subdroite avant l'extrémité. Dessous lisse, avec l'abdomen parsemé de poils de la même couleur que ceux du dessus.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre (Rolle). — Un exemplaire de ma collection.

MASTOGENINI DE MADAGASCAR

Tableau des genres.

Antennes courtes avec les derniers articles triangulaires, dépassant un peu la base du prothorax, celui-ci avec une seule carène latérale . . . . . **Ankareus**

Antennes à articles anormalement allongés dépassant très notablement la base du prothorax, celui-ci avec deux carènes latérales . . . . . **Sicardia**

Tableau des ANKAREUS.

1. Antennes de couleur foncée, concolores. . 2
   Antennes d'un jaune clair ainsi que les tarses et l'extrémité des tibias. . . . . *ruficornis* n. sp.
2. Vert ou bleu, les côtés du pronotum non dilatés en avant 3
   Bronzé, les côtés du pronotum dilatés en avant . . . . . *aenus*
3. Pronotum sillonné transversalement à la base . . . . . *cyanicollis*
   Pronotum non sillonné à la base . . . . *subcyaneus*

Tableau des SICARDIA

1. Taille petite, moins de 3 mill. 2
   Taille grande, plus de 3 mill. . . . . *opaca* n. sp.
2. Elytres avec un pli bien marqué à la base et un sillon derrière celui-ci. 3
   Elytres simplement impressionnés à la base *tristis*
3. Bleu, élytres médiocrement pubescents, la carène interne du pronotum raccourcie. . *rufitarsis* n. sp.
   Noir bleuâtre, couvert d'une couche de poils brillants excessivement serrés et visibles seulement quand on regarde l'insecte tout à fait de côté, carène interne du pronotum entière . . . . . *micrastoïdes* n. sp.

Ankareus ruficornis nov. sp. — Long. 1.5 mill. — *Court, très convexe en dessus, arrondi en avant et en arrière, les côtés parallèles, le pronotum beaucoup plus large que les élytres, dessus d'un bleu brillant à reflets violacés, les antennes et les tarses ainsi que le sommet des tibias entièrement testacés. Dessous noir.*

Tête fortement ponctuée, impressionnée en devant avec le front saillant, tronqué en avant, vaguement sillonné.

Pronotum très convexe ponctuation extrêmement espacée et très fine, portant des poils dirigés en avant, la marge antérieure faiblement échancrée, très finement et obsolétement rebordée par une fine strie formant un petit bourrelet saillant près des angles antérieurs qui sont aigus, très abaissés en dessous, les côtés arrondis, entièrement rebordés et sillonnés derrière la carène marginale; les angles postérieurs très obtus, la marge postérieure droite; le disque régulièrement bombé sans aucune impression.

Ecusson grand en triangle isocèle, très brillant.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, très convexes, parallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, arrondis ensuite jusqu'au sommet où ils sont subtronqués et conjointement arrondis, ils ne portent aucune impression sauf un profond sillon derrière la base qui est relevée en bourrelet; le disque est finement et régulièrement ponctué, la ponctuation égale est bien nette portant des petites soies.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection.

Sicardia opaca nov. sp. — Long. 3.65 mill.; larg. 1.65 mill. — *Elliptique, allongé, subparallèle, le prothorax un peu plus large que les élytres, d'aspect granuleux : noir mat, avec de vagues taches blanchâtres dues à une légère pubescence.*

Tête bombée avec le front saillant en bourrelet entre les yeux qui sont rapprochés en dessus, sillonné sur le front qui est très fortement granuleux et non différencié de l'épistome; celui-ci assez grand échancré en arc de cercle en avant et avec les branches latérales longues, les cavités antennaires ouvertes sur les côtés avec le premier article des antennes logé dans une rainure sous l'œil, antennes longues, les articles grêles et très allongés, de 4 à 5 fois aussi longs que larges, les derniers articles faiblement dentés au sommet.

Prothorax régulièrement bombé, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, un peu rétréci en avant avec la marge antérieure presque droite, rebordée d'une fine strie, les angles antérieurs aigus, les côtés régulièrement arrondis et bordés de deux carènes latérales subparallèles sur toute leur longueur, les angles postérieurs obtus, la base droite, le disque finement granuleux et un peu bossué sur la ligne médiane transversale.

Ecusson subtriangulaire, allongé, lisse, un peu concave.

Elytres de la largeur du prothorax à la base, subparallèles surles

bords jusqu'au quart postérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet où ils sont isolément arrondis avec l'angle sutural très obtus, la base est bordée d'une très fine carène, le calus huméral n'est pas marqué, ils sont rebordés latéralement par une fine carène, impressionnés sur la suture, principalement à l'apex et ne portent aucune trace de stries, le disque est irrégulièrement et peu sensiblement bossué et les parties basses sont garnies d'une rare pubescence grise couchée. Dessous d'aspect granuleux et légèrement pubescent.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection.

Se distingue de *Sicardia tristis* m. par sa taille considérablement plus avantageuse, les carènes du pronotum non réunies aux extrémités, la surface plus rugueuse, etc.

Sicardia rufitarsis nov. sp. — Long. 2 mill. — *Oblong, très convexe en dessus les côtés parallèles, le pronotum de la même largeur que les élytres, les extrémités arrondies, entièrement d'un bleu violet en dessus, dessous noir brillant.*

Tête fortement ponctuée, front bombé et saillant, sillonné ainsi que le vertex, yeux rapprochés en dessus, antennes très longues, fortement pubescentes sur les articles dentés, avec le premier article pyriforme, le deuxième subglobuleux, le troisième court, subcylindrique, les suivants allongés, faiblement dentés à l'extrémité.

Pronotum très convexe, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, avec le bord antérieur presque droit, finement rebordé, les angles antérieurs aigus abaissés en dessous, les côtés arrondis, bordés d'une double carène, l'interne assez distante de l'externe, partant de l'angle postérieur qui est obtus et subdenté et n'atteignant pas la marge antérieure, la marge postérieure droite et rebordée par une petite lame lisse, le disque vaguement impressionné sur la ligne médiane en avant, fortement ponctué sur les côtés en avant et couvert de rides transversales sur le reste de la surface.

Ecusson moyen, subcordiforme, lisse, sillonné dans sa longueur.

Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, parallèles jusqu'au quart postérieur, ensuite atténués, régulièrement et conjointement arrondis au sommet, le disque est régulièrement convexe sauf un sillon transversal derrière la base, il est régulièrement ponctué sur un fond légèrement pointillé et légèrement pubescent. Le dessous est fortement ponctué, les tarses roussâtres.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. – Un exemplaire de ma collection.

Sicardia micrastoïdes nov. sp. — Long. 1.8 à 2.1 mill. — *Oblong, entièrement noir, très convexe en dessus, les côtés parallèles, le pronotum un peu plus large que les étytres, les extrémités arrondies.*

Tête bombée sur le front qui est saillant en avant, fortement ponctuée, yeux peu rapprochés en dessus, antennes noires pubescentes, à articles moins allongés que dans l'espèce précédente, mais dépassant cependant de beaucoup la base du prothorax.

Pronotum très convexe et régulièrement bombé sans aucune impression, ayant sa plus grande largeur au milieu, à peine échancré au bord antérieur, les angles antérieurs aigus et très abaissés, les côtés régulièrement arrondis, bordés de deux carènes latérales subparallèles et atteignent toutes deux le bord antérieur sans se joindre, les angles postérieurs obtus, la base droite, le disque fortement ponctué sur les bords avec des stries tranversales courbes sur la partie postérieure du disque, couvert d'une pubescence bien visible seulement en regardant l'insecte de côté.

Ecusson assez grand, lisse, en ogive renversée.

Elytres de la même largeur que le prothorax à la base, parallèles jusqu'après le tiers postérieur, ensuite atténués régulièrement et conjointement arrondis au sommet où ils sont légèrement subtronqués, le disque est régulièrement convexe sans impression qu'un profond sillon transversal à arête vive en avant et situé derrière la base à une certaine distance du bord, la partie comprise entre le sillon et la base lisse, le disque très fortement et densement ponctué surtout sur les bords et couvert de pubescence, vu de côté le disque présente une autre pubescence très dense, dressée et très brillante.

Patrie : Madagascar, Montagne d'Ambre. — Un exemplaire de ma collection, et collection du Dr Sicard. Ma collection renferme un deuxième exemplaire de cette espèce sans indication de provenance.